



Eigenschappen

Amora



| | |
|-------------------|---------------|
| Afrijping | 7,5 (vroeg) |
| Schilkleur | Geel |
| Vleeskleur | Geel |
| Aantal kn/pl | 8-12 |
| Grofheid | 7 |
| Stootblauw | 4 |
| Rooibeschatiging | 5 |
| Rel. opbrengst | Gemiddeld |
| OWG | 390 |
| Phytophthora-loof | Matig vatbaar |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Phytophthora-knol | Weinig vatbaar |
| Schurft | Weinig vatbaar |
| Ro 1,4 | R |
| Wratziekte f1 | Niet vatbaar (10) |
| Wratziekte f6 | Weinig vatbaar (6) |
| Kringerigheid | Weinig vatbaar |
| Kooktype | BC |
| Frites | 8 |
| Kiemrust | 5,5 |
| Bewaarbaarheid | 5 |

Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

| Maat | 75 cm rug | Planten per hectare pl/ha |
|----------------|-----------|---------------------------|
| 28/35 | 23-28 cm | 53.000 pl/ha |
| 35/55 | 32-35 cm | 41.000 pl/ha |
| 55/60 gesneden | 31-33 cm | 42.000 pl/ha |

Bemestingsrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

| Meststof | kg/ha | Toepassing 1e |
|-------------------------------|---------------------|---------------|
| N | 150-200* | 4/4 |
| P ₂ O ₅ | o.b.v. bodemanalyse | 4/4 |
| K ₂ O | 225-275 | 4/4 |

* Een ruimere N-bemesting geeft een later gewas en kans op een lager OWG

Aandachtspunten

Poten

- Pootgoed in mechanische koeling bewaren om fysiologische veroudering te beperken; maximaal één keer afkiemen.
- Pootgoed niet koud uit de koeling poten; eerst opwarmen en poten in het witte-puntjesstadium.
- Pootdiepte 2-4 cm onder maaiveld.
- Tijdens poten is een rijenbehandeling tegen Rhizoctonia aanbevolen.

Teelt

- Matig gevoelig voor Sencor; niet toepassen na opkomst.
- Voorzichtig met organische mest: beïnvloedt vroegheid en OWG nadelig.
- Voor vroege levering is een 2e N-gift niet nodig (afhankelijk van de mineralisatie).
- Geen chloorhoudende kali geven vanwege negatieve invloed op OWG.

Oogst & bewaring

- Geschikt voor vroege af land levering.
- Gevoelig voor stootblauw; voorzichtig rooien en na het rooien direct afleveren.