



Eigenschappen

Avarna



Afrijping	3 (laat)
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Wit
Aantal kn/pl	16
Stootblauw	5
Rooibeschatiging	6
Rel. opbrengst	Hoog
OWG	480

Phytophthora-loof	7
Phytophthora-knol	8,5
Alternaria	6
Y-virus	7,5
Schurft	5
Kiemrust	8
Bewaarbaarheid	7

Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare pl/ha
28/35	26 cm	51.000 pl/ha
35/55	33 cm	40.000 pl/ha

Bemestingrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	140-160	3/3	
P ₂ O ₅	o.b.v. bodemanalyse	4/4	
K ₂ O	220-250	3/4	1/4

Aardappelmoeheid

Ro1	Ro2,3	Pa2	Pa3	F2/6	F18
9	9	9	8	8/9	9

Wratziekte

Aandachtspunten

Poten

- Pootgoed in het witte-puntjesstadium en in goede structuur poten. Avarna heeft veel tal en een regelmatige maar trage opkomst.
- Houd bij de perceelskeuze rekening met gevoeligheid voor schurft.

Teelt

- Normaal Phytophthora-spuitschema aanhouden.
- Preventieve Alternaria-bestrijding aanbevolen.

Oogst & bewaring

- Bij rooien en inschuren extra voorzichtig vanwege beschadigingsgevoeligheid.
- Rekening houden met late afrijping.
- Na wondheling geleidelijk terugkoelen en bewaren bij een stabiele temperatuur van 7 °C.