



Eigenschappen

**BMC**



Afrijping	4 (middenlaat)
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Wit/geel
Aantal kn/pl	16
Stootblauw	5
Rooibeschatiging	6
Rel. opbrengst	Hoog
OWG	530

Phytophthora-loof	5,5
Phytophthora-knol	8
Alternaria	6
Y-virus	9
Schurft	5
Kiemrust	7
Bewaarbaarheid	8

**Plantafstanden** (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare pl/ha
28/35	26 cm	51.000 pl/ha
35/55	33 cm	40.000 pl/ha

**Bemestingrichtlijn** (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	190-220	2/3	1/3
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	o.b.v. bodemanalyse	4/4	
K <sub>2</sub> O	220-250	3/4	1/4

**Aardappelmoeheid**

**Wratziekte**

Ro1	Ro2,3	Pa2	Pa3	F2/6	F18
9	9	9	9	9	9

**Aandachtspunten**

**Poten**

- Pootgoed in het witte-puntjesstadium en in goede structuur poten.
- Niet geschikt voor de droogste zandpercelen.
- Iets onregelmatige opkomst.

**Teelt**

- BMC heeft veel tal.

**Oogst & bewaring**

- Bij rooien en inschuren extra aandacht voor beschadiging vanwege hoog OWG.
- Na wondheling geleidelijk terugkoelen en bewaren bij een stabiele temperatuur van 7 °C.
- BMC is gevoelig voor suikervorming in de bewaring; nauwkeurige sturing is nodig om een hoge suikeropbouw te voorkomen.
- Uitermate geschikt voor lange bewaring.