



Caractéristiques

Donata



Précocité	6,5 (Entre Fontane et Innovator)
Couleur de peau	Jaune
Couleur de chair	Jaune clair
Nombre tub/pl	10
Grosseurs tub	8
Coups	6 (assez sensible)
Dégâts de mécanique	6,5
Rendement	Très élevé
Matière sèche / Poids sous l'eau	22,6 / 420
Mildiou du feuillage	5
Mildiou du tubercule	6

Gale	6,5
Ro 1, 4	Résistant
Maladie des verrues f1	Résistant
Virus rattle du tabac	5
Virus Y	Peu sensible
Rhizoctonia	Sensible
Type de cuisson	BC
Frites	8
Dormance	8
Durée de conservation	7

Densité de plantation (en fonction du nombre de tubercules par 100 kg)

Calibre	Rangs de 75 cm	Rangs de 90 cm	Densité pl./ha
28/35	23-26 cm	19-22 cm	55.000 pl./ha
35/50	33-36 cm	28-30 cm	40.000 pl./ha
50/55	36-39 cm	30-33 cm	36.000 pl./ha
50/60 (coupé)	31-34 cm	26-28 cm	41.000 pl./ha

Fertilisation (Conseil en fonction de l'analyse du sol)

Engrais	Kg./Ha	Application 1ère	Application 2e
N	180	3/4	1/4
P ₂ O ₅	100	4/4	
K ₂ O	350	3/4	1/4

Points d'attention

Plantation

- Ne planter pas les plants froids. Laissez-le d'abord se réchauffer et attendre le stade point blanc.
- Planter 2-4 cm sous le niveau du sol.

Intervention

- 2ème application N & K après la formation des tubercules.
- Suivre un programme de protection mildiou normal
- Déclencher assez tôt la protection contre l'alternaria

Récolte et conservation

- Attendre la formation totale de la peau avant récolte Arracher dans des bonnes conditions est nécessaire. Donata est sensible aux dégâts mécaniques.
- Après cicatrisation, refroidir progressivement et dans un endroit stable conserver à une température de 7 °C.