



Eigenschappen

Donata



Afrijping	7 (middenvroeg)
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Lichtgeel
Aantal kn/pl	11
Grofheid	8
Stootblauw	6
Rooibeschatiging	6,5
Rel. opbrengst	Hoog
OWG	420
Phytophthora-loof	5

Phytophthora-knol	6
Alternaria	5
Schurft	7
Ro 1,4	R
Wratziekte f1	R
Kringerigheid	5
Kooktype	BC
Frites	8
Kiemrust	8
Bewaarbaarheid	7

Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare pl/ha
28/35	23 cm	58.000 pl/ha
35/50	33 cm	40.000 pl/ha
50/55	36 cm	37.000 pl/ha
50/60 gesneden	31 cm	43.000 pl/ha

Poot 3 cm onder het maaiveld. Zorg voor een goede rugopbouw om groen te voorkomen

Bemestingrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	175-200	3/4	1/4
P ₂ O ₅	o.b.v. bodemanalyse	4/4	
K ₂ O	300-350	3/4	1/4

Aandachtspunten

Poten

- Pootgoed ruim van tevoren opwarmen; niet te vroeg poten.
- Poot 3 cm onder maaiveld en zorg voor een goede rugopbouw om vergroening te voorkomen.
- Donata is niet geschikt voor zandgrond.

Teelt

- Niet tot weinig gevoelig voor Sencor.
- 2e N-gift na knolzetting.
- Gevoelig voor kaligebrek.

Oogst & bewaring

- Doodgespoten perceel goed laten afharden. Donata is licht gevoelig voor rooibeschatiging en blauw. Wees alert bij het rooien en inschuren.
- Na de wondheling geleidelijk terugkoelen en bewaren bij een stabiele temperatuur van 7 °C.