



Eigenschaften Donata



Reifezeit	Mittelfrüh (7)	Anfälligkeit für Knollenfäule	6
Hautfarbe	Gelb	Alternaria	5
Schalensfarbe	Hellgelb	Schorf	7
Anzahl kn/pflanz	11	Ro 1,4	R
Grobheit	8	Kartoffelkrebs f1	R
Blaufleckigkeit	6	Tabak-Rattle-Virus	5
Ernte Beschädigung	6,5	Kochtyp	BC
Ertrag	Hoch	Pommes frites	8
Stärkegehalt (UWG)	420	Keimruhe	8
Anfälligkeit für Krautfäule	5	Lagerfähigkeit	7

Pflanzabstände (abhängig von der Anzahl der Knollen pro 10 kg)

Größe	75 cm Reihenabstand	Pflanzen pro Hektar Pfl/ha
28/35	23 cm	58.000 Pfl/ha
35/50	33 cm	40.000 Pfl/ha
50/55	36 cm	37.000 Pfl/ha
50/60 Geschnitten	31 cm	43.000 Pfl/ha

Richtwerte Düngung (Nährstoffbedarf abhängig der Bodenanalyse)

Dünger	kg/ha	Anwendung 1	Anwendung 2
N	175-200	3/4	1/4
P ₂ O ₅	auf Basis der Bodenanalyse	4/4	
K ₂ O	300-350	3/4	1/4

Aufmerksamkeitspunkte

Pflanzung

- Pflanzkartoffeln lange vor dem Pflanzen aufwärmen. Nicht zu früh pflanzen!
- Pflanztiefe 3cm unter normalen Niveau. Sorge für einen guten Dammaufbau, um Grünbildung zu vermeiden.
- Donata ist nicht für Sandboden geeignet.

Feldbewirtschaftung

- Donata ist wenig bis gar nicht empfindlich gegenüber Sencor.
- Zweite N-Gabe nach der Knollenbildung.

Ernte und Lagerung

- Abgespritztes Feld gut aushärten lassen. Donata ist etwas empfindlich gegenüber Ernteschäden und blaufleckigkeit. Sei beim Ernten und Einlagern aufmerksam.
- Nach der Wundheilung allmählich zurückkühlen und bei einer stabilen Temperatur von 7 °C lagern.