



Caractéristiques

# Francis



Précocité	8 (précoce)
Couleur de peau	Jaune
Couleur de chair	Jaune clair
Nombre tub/pl	9-12
Grosueur des tubercules	7,8
Coups bleus	6
Endommagements	7
Rendement	Bon
Matière sèche / Poids sous l'eau	21,7 / 410
Mildiou - feuillage	6

Mildiou - tubercule	7
Gale	6
Nématodes Ro 1	Résistant
Galle verruqueuse f1	Sensible
Virus rattle du tabac TRV	7
Type de cuisson	C
Fritabilité	8
Dormance	6
Conservation	7

## Densité de plantation (en fonction du nombre de tubercules par 10 kg)

Calibre	Rangs de 75 cm	Rangs de 90 cm	Densité pl./ha
35/50	36-39 cm	30-33 cm	36.000 pl./ha
50/60 (plant coupé)	34-37 cm	28-31 cm	38.000 pl./ha

## Fertilisation (raisonnement à baser, entre autres critères, sur une analyse de sol)

Engrais	Kg./Ha	Application 1ère	Application 2e
N	200	3/4	1/4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	100	4/4	
K <sub>2</sub> O	300	4/4	

## Précautions

### Plantation

- Évitez l'égermage.
- Plantez plus serré dans les sols argileux.
- Plantez à 17 cm sous le niveau du sol et veillez à obtenir une bonne structure de butte afin d'éviter les pommes vertes.
- Un traitement contre la rhizoctonia est recommandé.

### Intervention

- Suivre un calendrier de pulvérisation mildiou normal. Accorder beaucoup d'attention au traitement des parcelles jusqu'à la fin.
- Dans les sols légers & départ précoce, un deuxième apport d'azote est recommandé peu après tubérisation.
- L'irrigation est recommandée au besoin pour un départ précoce.

### Récolte et conservation

- Avant récolte, bien laisser durcir la peau sur les parcelles défanées chimiquement.