



Eigenschappen

Francis



Afrijping	8 (vroeg tot zeer vroeg)
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Lichtgeel
Knolvorm	Langovaal
Aantal kn/pl	9-11
Grofheid	8
Stootblauw	7
Rooibeschatiging	7
Rel. opbrengst	Gemiddeld tot hoog
OWG	400

Phytophthora-loof	6
Phytophthora-knol	7
Schurft	6
Ro 1	R
Wratziekte f1	V
Kringerigheid	7
Kooktype	C
Frites	8
Kiemrust	6
Bewaarbaarheid	7

Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare pl/ha
35/50	34-36 cm	38.000 pl/ha
50/60 gesneden	32-34 cm	41.000 pl/ha

Poot 4 cm onder het maaiveld

Bemestingrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	190-210	3/4	1/4
P ₂ O ₅	o.b.v. bodemanalyse +10%	4/4	
K ₂ O	275-325	3/4	1/4

Voor een vroege oogst, vermijd chloride houdende K₂O-meststoffen
Bemesting met micronutriënten wordt sterk aanbevolen.

Aandachtspunten

Poten

- Pootgoed maximaal één keer afkiemen.
- Poot in het witte-puntjesstadium of voorgekiemd, 4 cm onder maaiveld.
- Grondbedekking: 14 cm voor de vroege teelt, 16-17 cm onder normale omstandigheden.
- Rhizoctonia-behandeling aanbevolen.

Teelt

- Niet gevoelig voor Sencor.
- K-gift vlak voor poten én rond knolzetting.
- Indien nodig, de 2e N-gift na knolzetting.

Oogst & bewaring

- Vroeg ras, geschikt voor af land levering.