



Eigenschappen

Lady Jane



Afrijping	(6) midden	Phytophthora-knol	7
Schilkleur	Donkergeel	Schurft	6,5
Vleeskleur	Geel	Ro 1	R
Aantal kn/pl	14	Wratziekte f1	R
Grofheid	8	Kringerigheid	6
Stootblauw	5 (gevoelig)	Y-virus	8
Rooibeschatiging	6	Kooktype	C
Rel. opbrengst	Vrij hoog	Frites	8
OWG	410-435	Kiemrust	6
Phytophthora-loof	9	Bewaarbaarheid	7

Plantafstanden* (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare pl/ha
28/35	25 cm	53.000 pl/ha
35/50	35 cm	38.000 pl/ha
35/55	37 cm	36.000 pl/ha
50/60 gesneden	34 cm	38.500 pl/ha
60/70 gesneden	36 cm	37.000 pl/ha

Bemestingrichtlijn** (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	180-220	3/4	1/4
P ₂ O ₅	o.b.v. bodemanalyse + 10%	4/4	
K ₂ O	250-300	3/4	1/4

Aandachtspunten

Poten

- Pootgoed op temperatuur brengen; 2 cm onder maaiveld poten.

Teelt

- Licht tot matig gevoelig voor Sencor.
- K-gift vlak voor poten én rond knolzetting.
- 2e N-gift na knolzetting.
- Sterk tegen Phytophthora, maar bij normale ziektedruk preventief gewasbescherming toepassen en controleren en bij hoge druk normaal schema volgen.
- Pas op voor resistentiedoorbraak en zorg voor goede bestrijding van aardappelopslag.

Oogst & bewaring

- Doodgespoten perceel goed laten afharden; Lady Jane is gevoelig voor blauw en rooibeschatiging.
- Een gemiddelde kiemrust: na wondheling geleidelijk terugkoelen en bewaren bij een stabiele temperatuur van 7 °C.
- Geen ethyleen gebruiken.

* Op zware kleigronden iets nauwer poten

** Indien volgens analyse nodig: een kleine hoeveelheid B, Mg, Mn, S toedienen.
Gebruik op gevoelige gronden Calcium en Borium tegen interne gebreken.