



Eigenschappen

Lugano



Afrijping	5,5 (middenlaat)
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Lichtgeel tot geel
Aantal kn/pl	7-9
Grofheid	8
Stootblauw	6
Rooibeschatiging	4,5
Rel. opbrengst	Vrij hoog
OWG	390-395
Phytophthora-loof	5

Phytophthora-knol	5,5
Schurft	5,5
Ro 1,2,3,4,5 Pa2,3	R
Wratziekte f1,6	R, WV
Kringerigheid	5,5
Y-virus	5,5
Kooktype	B
Frites	8
Kiemrust	8
Bewaarbaarheid	7

Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare pl/ha
28/35	21-22 cm	60.000 pl/ha
35/50	29-32 cm	45.000 pl/ha
50/55	35-37 cm	37.000 pl/ha
50/60 gesneden	29-32 cm	45.000 pl/ha

Bemestingrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	200-230	2/3	1/3
P ₂ O ₅	o.b.v. bodemanalyse	4/4	
K ₂ O	275-325	4/4	

Aandachtspunten

Poten

- Pootgoed niet koud uit de koeling poten. Eerst laten opwarmen en in het witte-puntjesstadium poten.
- Poot niet te vroeg en maximaal 2 keer afkiemen.
- Poot 2 cm onder maaiveld. Zorg voor een goede rugopbouw; Lugano kan grove knollen geven.

Teelt

- Niet tot weinig gevoelig voor Sencor.
- 2e N-gift na knolzetting.
- Chloorhoudende kali wordt sterk afgeraden als bijbemesting.

Oogst & bewaring

- Doodgespoten perceel goed laten afharden (3 weken); Lugano is zeer gevoelig voor rooibeschatiging en stootblauw. Voorzichtig rooien en niet rooien onder te droge omstandigheden.
- Na de wondheling geleidelijk terugkoelen en bewaren bij een stabiele temperatuur van minimaal 7 °C.
- Geen Ethyleen gebruiken als kiemremmer.
- Lange kiemrust.