



Caractéristiques

# Lugano



Précocité	5.5 (Similaire à Fontane)
Couleur de peau	Jaune
Couleur de chair	Jaune clair
Nombre tub/pl	7 (assez faible)
Grosseurs tub	8 (gros)
Coups	7 (sensible)
Dégâts de mécanique	7 (sensible)
Rendement	Élevé
Matière sèche / Poids sous l'eau	21,2 / 390
Mildiou du feuillage	5 (assez sensible)
Mildiou du tubercule	5,5 (assez sensible)

Gale	5,5
Ro 1, 4	Résistant
Maladie des verrues f1	Résistant
Virus rattle du tabac	5,5
Virus Y	Sensible
Rhizoctonia	Bonne résistance
Type de cuisson	B
Frites	8
Dormance	8
Durée de conservation	7

## Densité de plantation (en fonction du nombre de tubercules par 10 kg)

Calibre	Rangs de 75 cm	Rangs de 90 cm	Densité pl./ha
28/35	22-25 cm	18-21 cm	61.000 pl./ha
35/50	28-31 cm	23-26 cm	48.000 pl./ha
50/55	32-35 cm	26-29 cm	42.000 pl./ha
50/60 (coupé)	28-31 cm	23-26 cm	48.000 pl./ha

## Fertilisation (Conseil en fonction de l'analyse du sol)

Engrais	Kg./Ha	Application 1ère	Application 2e
N	220	2/3	1/3
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	100	4/4	
K <sub>2</sub> O	320	4/4	

## Points d'attention

### Plantation

- Ne pas égermer les plants.
- Porter les pommes de terre de semence à température. Planter légèrement en dessous du niveau du sol.
- Veiller à former de bonnes buttes – Lugano peut produire des tubercules assez gros.

### Intervention

- Apporter la deuxième dose d'azote après la floraison.
- Les apports de potassium contenant du chlore sont fortement déconseillés.

### Récolte et conservation

- Après la destruction du feuillage, laisser bien durcir le champ (3 semaines). Lugano est très sensible aux blessures de récolte et aux coups bleus : récolter avec précaution et éviter de récolter en conditions trop sèches.
- Après la cicatrisation, refroidir progressivement et stocker à une température stable d'au minimum 7 °C.
- Lugano a une longue dormance. Ne pas utiliser d'éthylène comme anti-germinatif.