



Eigenschappen

Markies



| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|-----|
| Afrijping | 4 (laat) | Phytophthora-knol | 7 |
| Schilkleur | Geel | Schurft | 5 |
| Vleeskleur | Lichtgeel | Ro 1,4 | R |
| Aantal kn/pl | 10-12 | Wratziekte f1 | V |
| Grofheid | 8 | Kringerigheid | 4 |
| Stootblauw | 8 | Y-virus | 7,5 |
| Rooibeschatiging | 5 | Kooktype | BC |
| Rel. opbrengst | Hoog | Frites | 8 |
| OWG | 425 | Kiemrust | 7 |
| Phytophthora-loof | 6,5 | Bewaarbaarheid | 8 |

Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

| Maat | 75 cm rug | Planten per hectare pl/ha |
|----------------|-----------|---------------------------|
| 28/35 | 24-26 cm | 53.000 pl/ha |
| 35/50 | 34-36 cm | 38.000 pl/ha |
| 50/55 | 37-39 cm | 35.000 pl/ha |
| 50/60 gesneden | 34-36 cm | 38.000 pl/ha |

Bemestingrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

| Meststof | kg/ha | Toepassing 1e | Toepassing 2e | Toepassing 3e |
|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| N | 175-200 | 2/4 | 1/4 | 1/4 |
| P ₂ O ₅ | o.b.v. bodemanalyse | 4/4 | | |
| K ₂ O | 250-300 | 2/3 | 1/3 | |

Aandachtspunten

Poten

- Pootgoed niet koud uit de koeling poten; eerst laten opwarmen en in het witte-puntjesstadium poten.
- Schurftgevoelige gronden vermijden.

Teelt

- Niet tot weinig gevoelig voor Sencor.
- 2e N-gift kort na knolzetting.
- Zeer gevoelig voor Alternaria.

Oogst & bewaring

- Een combinatie van loofklappen en spuiten is nodig om zorgvuldig te rooien.
- Doodgespoten perceel goed laten afhardnen; Markies is matig gevoelig voor rooibeschatiging.
- Na de wondheling geleidelijk terugkoelen en bewaren bij een stabiele temperatuur van 7 °C.