



Eigenschaften

# Markies



Reifezeit	Spät (4)	Anfälligkeit für Knollenfäule	7
Hautfarbe	Gelb	Schorf	5
Schalensfarbe	Hellgelb	Ro 1,4	R
Anzahl kn/pflanz	10-12	Kartoffelkrebs f1	V
Grobheit	8	Tabak-Rattle-Virus	4
Blaufleckigkeit	8	Y-virus	7,5
Ernte Beschädigung	5	Kochtyp	BC
Ertrag	Hoch	Pommes frites	8
Stärkegehalt (UWG)	425	Keimruhe	7
Anfälligkeit für Krautfäule	6,5	Lagerfähigkeit	8

## Pflanzenabstände (abhängig von der Anzahl der Knollen pro 10 kg)

Größe	75 cm Reihenabstand	Pflanzen pro Hektar Pfl/ha
28/35	24-26 cm	53.000 Pfl/ha
35/50	34-36 cm	38.000 Pfl/ha
50/55	37-39 cm	35.000 Pfl/ha
50/60 <small>Geschnitten</small>	34-36 cm	38.000 Pfl/ha

## Richtwerte Düngung (Nährstoffbedarf abhängig der Bodenanalyse)

Dünger	kg/ha	Anwendung 1	Anwendung 2	Anwendung 3
N	175-200	2/4	1/4	1/4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	auf Basis der Bodenanalyse	4/4		
K <sub>2</sub> O	250-300	2/3	1/3	

## Aufmerksamkeitspunkte

### Pflanzung

- Pflanzkartoffeln nicht kalt aus der Kühlung pflanzen. Zuerst aufwärmen und im weißen Spitzenstadium pflanzen.
- Schorfempfindliche Böden vermeiden.

### Feldbewirtschaftung

- Markies ist wenig bis gar nicht empfindlich gegenüber Sencor.
- Zweite N-Gabe kurz nach der Knollenbildung.
- Markies ist sehr empfindlich gegenüber Alternaria.

### Ernte und Lagerung

- Eine Kombination aus Krautschlagen und Spritzen ist notwendig, um sorgfältig zu ernten. Abgespritztes Feld gut aushärten lassen, Markies ist mäßig empfindlich gegenüber Ernteschäden.
- Nach der Wundheilung allmählich zurückkühlen und bei einer stabilen Temperatur von 7 °C lagern.