



Caractéristiques

Markies



Précocité	4 (tardive)
Couleur de peau	Jaune
Couleur de chair	Jaune clair
Nombre tub/pl	10-12
Grosseur des tubercules	8
Coups bleus	8
Endommagements	5
Rendement	Élevé
Matière sèche / Poids sous l'eau	22,9 / 425
Mildiou - feuillage	6,5

Mildiou - tubercule	6,5
Gale	5
Nématodes Ro 1, 4	Résistant
Galle verruqueuse f1	Sensible
Virus rattle du tabac TRV	4
Virus Y	Peu sensible
Type de cuisson	BC
Fritabilité	8
Dormance	7
Conservation	8

Densité de plantation (en fonction du nombre de tubercules par 10 kg)

Calibre	Rangs de 75 cm	Rangs de 90 cm	Densité pl./ha
28/35	24-26 cm	20-23 cm	53.000 pl./ha
35/50	34-36 cm	29-32 cm	38.000 pl./ha
50/55	37-39 cm	31-34 cm	35.000 pl./ha
50/60 (plant coupé)	34-36 cm	29-34 cm	38.000 pl./ha

Fertilisation* (raisonnement à baser, entre autres critères, sur une analyse de sol)

Engrais	Kg./Ha	Application 1ère	Application 2e	Application 3e
N	200	2/4	1/4	1/4
P ₂ O ₅	100	4/4		
K ₂ O	310	2/3	1/3	

Précautions

Plantation

- Ne pas planter les plants à froid en sortie de frigo. Les laisser d'abord réchauffer et planter au stade « points blancs ». Éviter les sols sensibles à la gale.

Intervention

- 2e application d'azote peu après tubérisation.
- Suivre un calendrier de pulvérisation mildiou normal. La Markies est très sensible à l'alternariose.
- Markies est très sensible aux acariens, si possible planter une variété non-sensible en fourrière.

Récolte et conservation

- Une combinaison de broyage et de défanage chimique est nécessaire pour arracher soigneusement.
- Bien laisser se former la peau pour les parcelles défanées chimiquement, la Markies est moyennement sensible aux endommagements mécaniques.
- Après cicatrisation, refroidir progressivement à nouveau et conserver à une température stable de 7 °C.

* La potasse chlorée n'est pas problématique en raison de la matière sèche élevée.