



Eigenschappen

# Miranda



Afrijping	7,5 (vroeg)	Phytophthora-knol	6,5
Schilkleur	Geel	Schurft	7
Vleeskleur	Lichtgeel	Ro 1,4 (A)	R (resistent)
Vorm	LO (langovaal)	Wratziekte f1	R (resistent)
Aantal kn/pl	10-12	Kringerigheid	7
Grofheid	7,5	Y-virus	7
Stootblauw	7	Kooktype	B
Rooibeschatiging	6	Frites	8
Rel. opbrengst	Hoog	Kiemrust	8
OWG	390-395	Bewaarbaarheid	7
Phytophthora-loof	4,5		

## Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare pl/ha
35/50	34 cm	40.000 pl/ha
50/60 gesneden	32 cm	42.000 pl/ha

Op zwaardere kleigronden iets nauwer poten.

## Bemestingrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	200-225	3/4	1/4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	o.b.v bodemanalyse	4/4	
K <sub>2</sub> O	250-300	4/4	

Een extra toediening van Magnesium en Mangaan vroeg in het teeltseizoen wordt geadviseerd.

## Aandachtspunten

### Poten

- Poot in het witte-puntjesstadium; niet te vroeg poten.
- Poot 2 cm onder maaiveld om vergroening te voorkomen.

### Teelt

- Matig gevoelig voor Sencor.
- 2e N-gift kort na knolzetting.

### Oogst & bewaring

- Voor het rooien de knollen goed laten afharden, rooibeschatiging vermijden.
- Geschikt voor af land levering én bewaring tot april bij 7 °C.