



Eigenschappen

Plasettie



Afrijping	5,5	Phytophthora-loof	5,5
Schilkleur	Geel	Phytophthora-knol	7
Vleeskleur	Lichtgeel	Alternaria	NB
Aantal kn/pl	13	Schurft	7
Stootblauw	6	Kringerigheid	7
Rooibeschatiging	7	Y-virus	7,5
Rel. opbrengst	Gemiddeld	Kiemrust	6,5
OWG	445	Bewaarbaarheid	7

Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare pl/ha
28/35	20-22 cm	66.000 pl/ha
35/50	30-32 cm	41.500 pl/ha

Bemestingsrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	200-230	4/5	1/5
P ₂ O ₅	o.b.v. bodemanalyse	4/4	
K ₂ O	220-250	4/4	

Aardappelmoeheid

Ro1	Ro2,3	Pa2	Pa3	F1	F6	F18	F38
9	9	9	4	10	10	10	9

Wratziekte

Aandachtspunten

Poten

- Pootgoed in het witte-puntjesstadium poten, in een goede structuur.

Teelt

- Lijkt niet gevoelig voor Sencor, niet toepassen na opkomst.
- Voldoende stikstof aan de basis geven voor loofontwikkeling en onkruidonderdrukking.
- Bijbemesting kan nodig zijn tijdens het seizoen om het gewas lang genoeg te laten doorgroeien.

Oogst & bewaring

- Doodgespoten perceel goed laten afharden; rooi alleen bij droog weer.
- Na het oogsten het product zo snel mogelijk droog draaien en droog houden.
- Na wondheling geleidelijk terugkoelen en bewaren bij een stabiele temperatuur van 7 °C.