



Caractéristiques

Première



Précocité	8 (très hâtive)
Couleur de peau	Jaune
Couleur de chair	Jaune
Nombre tub/pl	10
Grosueur des tubercules	6,5
Coups bleus	6
Endommagements	6
Rendement	Assez élevé
Matière sèche / Poids sous l'eau	21,9 / 405
Mildiou - feuillage	4
Mildiou - tubercule	6

Gale	5
Nématodes Ro 1, 4	Résistant
Galle verruqueuse f1	Résistant
Virus rattle du tabac TRV	8
Virus Y	Sensible
Rhizoctonia	Assez sensible
Type de cuisson	BC
Fritabilité	6,5
Dormance	5
Conservation	5

Densité de plantation (en fonction du nombre de tubercules par 10 kg)

Calibre	Rangs de 75 cm	Rangs de 90 cm	Densité pl./ha
28/35	26-28 cm	21-24 cm	50.000 pl./ha
35/50	32-34 cm	26-29 cm	40.000 pl./ha

Fertilisation (raisonnement à baser, entre autres critères, sur une analyse de sol)

Engrais	Kg./Ha	Application 1ère
N	220	4/4
P ₂ O ₅	100	4/4
K ₂ O	320	4/4

Précautions

Plantation

- Un égermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre. La variété Première peut être plantée dès sa sortie de frigo avec un court choc thermique.

Intervention

- 2e application d'azote après tubérisation.

Récolte et conservation

- Bien laisser se former la peau sur les parcelles défanées, Première est très sensible aux endommagements mécaniques et coups.
- Convient à une livraison directe ou à un stockage court terme.