



Eigenschaften Edison



Reifezeit	Mittelfrüh (6)	Anfälligkeit für Krautfäule	4,5
Hautfarbe	Gelb	Anfälligkeit für Knollenfäule	5
Schalenfarbe	Hellgelb	Schorf	7
Form	LO (langoval)	Ro 1,4 (A)	R (resistant)
Anzahl kn/pflanz	12	Kartoffelkrebs f1	R (resistant)
Grobheit	8	Ringfäule	7
Blaufleckigkeit	8	Kochtyp	B
Ernte Beschädigung	6	Pommes frites	8
Ertrag	Hoch	Keimruhe	8
Stärkegehalt (UWG)	390-395	Lagerfähigkeit	7

Pflanzabstände (abhängig von der Anzahl der Knollen pro 10 kg)

Größe	75 cm Reihenabstand	Pflanzen pro Hektar
28/35	24 cm	55.600 Pfl/ha
35/45	30 cm	44.400 Pfl/ha
35/50	32 cm	42.000 Pfl/ha
50/60 Geschnitten	32 cm	42.000 Pfl/ha

Auf schwereren Lehmböden etwas enger pflanzen

Aufmerksamkeitspunkte

- Pflanzkartoffeln nicht kalt aus der Kühlung pflanzen. Zuerst aufwärmen und im weißen Spaltenstadium pflanzen. Nicht zu früh pflanzen und 2 cm unter der Bodenoberfläche.
- Edison ist leicht empfindlich gegenüber Sencor.
- Eine normale Phytophthora-Laubbekämpfung durchführen.
- Edison hat eine frühe Knollenbildung. Beginnen Sie rechtzeitig mit einer präventiven Phytophthora-Knollen- und Alternaria-Bekämpfung.
- Zweite N-Gabe kurz nach der Knollenbildung.
- Abgespritztes Feld gut aushärten lassen, Ernteschäden vermeiden.
- Nach der Wundheilung allmählich zurückkühlen und bei einer stabilen Temperatur von 7 °C lagern.

Richtwerte Düngung (Nährstoffbedarf abhängig der Bodenanalyse)

Dünger	kg/ha	Anwendung 1	Anwendung 2
N	180-220	3/4	1/4
P ₂ O ₅	auf Basis der Bodenanalyse + 10%	4/4	
K ₂ O	275-300	4/4	