



Eigenschappen

Donata



Afrijping	Middenvroeg (7)	Phytophthora-knol	6
Schilkleur	Geel	Alternaria	5
Vleeskleur	Lichtgeel	Schurft	7
Aantal kn/pl	11	Ro 1,4	R
Grofheid	8	Wratziekte f1	R
Stootblauw	6	Kringerigheid	5
Rooibeschatiging	6,5	Kooktype	BC
Rel. opbrengst	Hoog	Frites	8
OWG	420	Kiemrust	8
Phytophthora-loof	5	Bewaarbaarheid	7

Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare
28/35	23 cm	58.000 pl/ha
35/50	33 cm	40.000 pl/ha
50/55	36 cm	37.000 pl/ha
50/60 gesneden	31 cm	43.000 pl/ha

Bemestingrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	175-200	3/4	1/4
P ₂ O ₅	o.b.v. bodemanalyse	4/4	
K ₂ O	275-325	3/4	1/4

Aandachtspunten

- Poters geruime tijd voor het poten opwarmen. Plant niet te vroeg!
- Poot 3 cm onder het maaiveld. Zorg voor een goede rugopbouw om groen tegen te gaan.
- Donata is niet tot weinig gevoelig voor Sencor.
- 2e N-gift na de knolzetting.
- Normaal Phytophthora spuitschema aanhouden. Alternaria bestrijding wordt aanbevolen.
- Inzet MH voor langere bewaring is aanbevolen.
- Doodgespoten perceel goed laten afharden. Donata is iets gevoelig voor rooibeschatiging en blauw. Wees alert bij het rooien en inschuren.
- Na de wondheling geleidelijk terug koelen en op een stabiele temperatuur van 7 °C bewaren.