



Eigenschappen

Innovator



Afrijping	6,8 (middenvroeg)
Schilkleur	Bruin
Vleeskleur	Lichtgeel
Aantal kn/pl	10
Grofheid	8
Stootblauw	6
Rooibeschatiging	4,5
Rel. opbrengst	Vrij hoog
OWG	380
Phytophthora-loof	4

Phytophthora-knol	6
Schurft	6,5
Pa2,3	R
Wratziekte f1	R
Kringerigheid	5,5
Kooktype	B
Frites	7,5
Kiemrust	6
Bewaarbaarheid	7

Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare
28/35	22-24 cm	58.000 pl/ha
35/50	31-33 cm	42.000 pl/ha
50/55	35-37 cm	37.000 pl/ha
50/60 gesneden	31-33 cm	42.000 pl/ha

Bemestingrichtlijn* (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e	Toepassing 3e
N	240-280	2/4	1/4	1/4
P ₂ O ₅	o.b.v. bodemanalyse + 20%	4/4		
K ₂ O	275-300	4/4		

Aandachtspunten

- Pootgoed eerst laten opwarmen en in het witte puntjes stadium poten. Plant niet te vroeg! Plant 3 cm onder het maaiveld. Een Rhizoctonia behandeling wordt aanbevolen.
- Innovator is gevoelig voor Sencor.
- 2e N-gift kort na de knolzetting. 3e gift na de bloei. Zorg ervoor dat het gewas vitaal blijft.
- Normaal Phytophthora spuitschema aanhouden. Tot eind aan toe aandacht geven!
- Doodgespoten perceel goed laten afharderen, Innovator is vrij gevoelig voor stootblauw.
- Na de wondheling geleidelijk terug koelen en op een stabiele temperatuur van 7 °C bewaren. Bij lange bewaring, op tijd beginnen met kiemremmersmiddelen.

* Geen chloorkali kort voor het poten.
Innovator is gevoelig voor mineralen tekorten. Breng de sporenelementen op een goed niveau.