



Eigenschappen

Lady Jane



Afrijping	(6) midden	Phytophthora-knol	7
Schilkleur	Donkergeel	Schurft	6,5
Vleeskleur	Geel	Ro 1	R
Aantal kn/pl	14	Wratziekte f1	R
Grofheid	8	Kringerigheid	6
Stootblauw	5 (gevoelig)	Kooktype	C
Rooibeschatiging	6	Frites	8
Rel. opbrengst	Vrij hoog	Kiemrust	6
OWG	410-435	Bewaarbaarheid	7
Phytophthora-loof	9		

Plantafstanden* (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare
28/35	25 cm	53.000 pl/ha
35/50	35 cm	38.000 pl/ha
35/55	37 cm	36.000 pl/ha
50/60 gesneden	34 cm	38.500 pl/ha
60/70 gesneden	36 cm	37.000 pl/ha

Bemestingsrichtlijn** (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	180-220	3/4	1/4
P ₂ O ₅	o.b.v. bodemanalyse + 10%	4/4	
K ₂ O	250-300	3/4	1/4

Aandachtspunten

- Pootgoed op temperatuur brengen voor poten. Poot 2 cm onder het maaiveld.
- Lady Jane is licht tot matig gevoelig voor Sencor.
- Geef een K-gift vlak voor het poten en rond knolzetting.
- 2e N-gift na de knolzetting.
- Lady Jane is sterk tegen Phytophthora, maar tijdens normale ziektedruk wel preventief gewasbescherming toepassen en het gewas blijven controleren. Bij hoge ziektedruk normaal schema aanhouden.
- Doodgespoten perceel goed laten afharden, Lady Jane is gevoelig voor blauw en rooibeschatiging.
- Lady Jane heeft een gemiddelde kiemrust, na de wondheling geleidelijk terug koelen en op een stabiele temperatuur van 7 °C bewaren. Geen Ethyleen gebruiken.

* Op zware kleigronden iets nauwer poten

** Indien volgens analyse nodig: een kleine hoeveelheid B, Mg, Mn, S toedienen.
Gebruik op gevoelige gronden Calcium en Borium tegen interne gebreken.