



Eigenschappen

Miranda



Afrijping	(7,5) vroeg	Phytophthora-loof	4,5
Schilkleur	Geel	Phytophthora-knol	6,5
Vleeskleur	Lichtgeel	Schurft	7
Vorm	LO (langovaal)	Ro 1,4 (A)	R (resistent)
Aantal kn/pl	10-12	Wratziekte f1	R (resistent)
Grofheid	7,5	Kringerigheid	7
Stootblauw	7	Kooktype	B
Rooibeschatiging	6	Frites	8
Rel. opbrengst	Hoog	Kiemrust	8
OWG	390-395	Bewaarbaarheid	7

Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare
35/50	34 cm	40.000 pl/ha
50/60 gesneden	32 cm	42.000 pl/ha

Op zwaardere kleigronden iets nauwer poten

Bemestingrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	200-225	3/4	1/4
P ₂ O ₅	o.b.v bodemanalyse	4/4	
K ₂ O	250-300	4/4	

Een extra toediening van Magnesium en Mangaan vroeg in het teeltseizoen wordt geadviseerd.

Aandachtspunten

- Poot in het witte puntjesstadium. Plant niet te vroeg!
- Poot 2 cm onder het maaiveld om groen te voorkomen.
- Miranda is matig gevoelig voor Sencor.
- Normaal Phytophthora spuitschema aanhouden. Begin op tijd met een preventieve Alternaria bespuiting.
- 2e N-gift, kort na de knolzetting.
- Voor het rooien de knollen goed laten afharderen, voorkom rooibeschatiging.
- Geschikt zowel voor de afield levering als bewaring tot april bij 7 °C.