



Eigenschappen

Novano



Afrijping	4,5 (middenlaat)
Schilkleur	Lichtgeel
Vleeskleur	Wit
Aantal kn/pl	12
Stootblauw	5
Rooibeschatiging	5
Rel. opbrengst	Hoog
OWG	490

Phytophthora-loof	7
Phytophthora-knol	8
Alternaria	5
Schurft	5
Fusarium	5
Kiemrust	8
Bewaarbaarheid	8

Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare
28/35	20 cm	66.000 pl/ha
35/55	33 cm	44.400 pl/ha

Bemestingrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	170-210	2/3	1/3
P ₂ O ₅	o.b.v. bodemanalyse	4/4	
K ₂ O	220-250	3/4	1/4

Aardappelmoeheid

Wratziekte

Ro1	Ro2,3	Pa2	Pa3	F2/6	F18
9	7	8	9	10	10

Aandachtspunten

- Novano heeft een lange kiemrust. Topspruit verwijderen. Poters iets warmer bewaren en in het witte puntjes stadium poten.
- Novano is na opkomst licht gevoelig voor Sencor.
- 2e N-gift na de knolzetting.
- Alert zijn op Alternaria. Een normaal Phytophthora spuitschema aanhouden.
- Inzet MH voor langere bewaring wordt aanbevolen.
- Doodgespoten perceel goed laten afhard.
- Voorkom dat de knollen tijdens het rooien beschadigen. De combinatie van beschadiging en Fusarium geeft rot in de bewaring. Rooi alleen bij droog weer.
- Na het oogsten het product zo snel mogelijk droog draaien en droog houden.
- Na de wondheling geleidelijk terug koelen en op een stabiele temperatuur van 6,5 °C bewaren.