



Eigenschappen

Plasettie



Afrijping	5,5
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Lichtgeel
Aantal kn/pl	13
Stootblauw	6
Rooibeschatiging	7
Rel. opbrengst	Gemiddeld
OWG	445
Phytophthora-loof	5,5
Phytophthora-knol	7

Alternaria	NB
Schurft	7
Kringerigheid	7
Kiemrust	6,5
Bewaarbaarheid	7

*Nieuw ras, voorlopige cijfers

Plantafstanden* (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare
28/35	20-22 cm	66.000 pl/ha
35/50	30-32 cm	41.500 pl/ha

Bemestingsrichtlijn* (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	200-230	4/5	1/5
P ₂ O ₅	o.b.v. bodemanalyse	4/4	
K ₂ O	220-250	4/4	

Aardappelmoetheid

Ro1	Ro2,3	Pa2	Pa3	F1	F18	F18
9	9	9	4	10	10	9

Wratziekte

Aandachtspunten

- Poters in het witte puntjes stadium in een goede structuur poten.
- Plasettie lijkt niet gevoelig voor Sencor, niet na opkomst toepassen.
- Voldoende stikstof aan de basis geven voor voldoende loofontwikkeling en onkruidonderdrukking. Bijbemesting tijdens het seizoen kan nodig zijn om gewas lang genoeg te laten doorgroeien.
- Normaal Phytophthora spuitschema aanhouden. Preventieve Alternaria bestrijding wordt aanbevolen.
- Inzet MH voor langere bewaring is aanbevolen.
- Doodgespoten perceel goed laten afharderen. Rooi alleen bij droog weer.
- Na het oogsten het product zo snel mogelijk droog draaien en droog houden.
- Na de wondheling geleidelijk terug koelen en op een stabiele temperatuur van 7 °C bewaren.