



Eigenschappen Senata



Afrijping	5
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Crème
Aantal kn/pl	13-15
Stootblauw	5
Rooibeschatiging	6
Rel. opbrengst	Gemiddeld
OWG	460
Phytophthora-loof	7
Phytophthora-knol	6

Alternaria	NB
Schurft	6,5
Kringerigheid	5
M. Chitwoodi	5
Kiemrust	7
Bewaarbaarheid	7

Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare
28/35	20-22 cm	63.000 pl/ha
35/50	32-33 cm	41.000 pl/ha

Aardappelmoeheid

Wratziekte

Ro1,4	Ro2,3	Pa2	Pa3	F1	F18
9	9	9	8	9	8

Bemestingsrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	150-160	3/4	1/4
P ₂ O ₅	o.b.v. bodemanalyse	4/4	
K ₂ O	200-240	4/4	
MgO	70		

Aandachtspunten

- Poters in het witte puntjes stadium in een goede structuur poten.
- In Senata geen Sencor toepassen na opkomst.
- Geen overbemesting nodig voor vroege af land levering. (eind augustus)
- Normaal Phytophthora spuitprogramma aanhouden. Preventieve Alternaria bestrijding wordt aanbevolen.
- Senata heeft een vlotte beginontwikkeling en is zowel geschikt voor vroege levering als voor levering uit de schuur.