



Eigenschappen

Victoria



Afrijping	6 (midden)
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Geel
Vorm	OLO (ovaal-lang ovaal)
Aantal kn/pl	9-11
Grofheid	8
Stootblauw	5
Rooibeschatiging	7
Rel. opbrengst	Hoog
OWG	380

Phytophthora-loof	4
Phytophthora-knol	7
Schurft	5
Ro 1,4	R
Wratziekte f1,6	R
Kringerigheid	8
Kooktype	B
Frites	8
Kiemrust	7
Bewaarbaarheid	7

Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare
28/35	25-27 cm	51.000 pl/ha
35/50	34-36 cm	38.000 pl/ha
50/55	38-40 cm	33.000 pl/ha
50-60 gesneden	32-34 cm	40.000 pl/ha

Bemestingrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	200-240	2/3	1/3
P ₂ O ₅	o.b.v. bodemanalyse	4/4	
K ₂ O	250-270	3/4	1/4

Geen chloorkali kort voor het poten

Aandachtspunten

- Pootgoed niet koud uit de koeling poten. Eerst laten opwarmen en in het witte puntjes stadium poten. Bij voorkeur op klei- en zavelgronden met een goede structuur(gevoelig voor misvorming). Zorg voor een goede, brede rugopbouw.
- Een Rhizoctonia behandeling wordt geadviseerd.
- Victoria is gevoelig voor Sencor, ook voor opkomst.
- 2e N-gift na de knolzetting. Normaal Phytophthora spuitschema aanhouden. Inzet MH voor langere bewaring is aanbevolen.
- Doodgespoten perceel goed laten afharden, Victoria is matig gevoelig voor rooibeschatiging en stootblauw.
- Na de wondheling geleidelijk terug koelen en op een stabiele temperatuur van 7 °C bewaren. Ventileer kort maar regelmatig om CO₂ ophoping te voorkomen.