



# Eigenschappen Senata



Afrijping	5	Phytophthora-knol	6
Schilkleur	Geel	Alternaria	NB
Vleeskleur	Crème	Schurft	6,5
Aantal kn/pl	13-15	Kringerigheid	5
Stootblauw	5	Y-virus	7
Rooibeschatiging	6	M. Chitwoodi	5
Rel. opbrengst	Gemiddeld	Kiemrust	7
OWG	460	Bewaarbaarheid	7
Phytophthora-loof	7		

## Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare pl/ha
28/35	20-22 cm	63.000 pl/ha
35/50	32-33 cm	41.000 pl/ha

## Bemestingsrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	150-160	3/4	1/4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	o.b.v. bodemanalyse	4/4	
K <sub>2</sub> O	200-240	4/4	
MgO	70		

## Aardappelmoeheid

Ro1,4	Ro2,3	Pa2	Pa3	Wratziekte	F1	F6	F18
9	9	9	8		10	9	8

## Aandachtspunten

### Poten

- Pootgoed in het witte-puntjesstadium en in een goede structuur poten.

### Teelt

- Geen Sencor toepassen na opkomst.
- Geen overbemesting nodig voor vroege af land levering (eind augustus).

### Oogst & bewaring

- Senata heeft een vlotte beginontwikkeling en is zowel geschikt voor vroege levering als voor levering uit de schuur.