



Eigenschappen

Simphony



Afrijping	4 (laat)	Phytophthora-loof	6
Schilkleur	Geel	Phytophthora-knol	8
Vleeskleur	Lichtgeel	Alternaria	5
Aantal kn/pl	9-11	Schurft	6
Stootblauw	4	Kringerigheid	5
Rooibeschatiging	5	Y-virus	7
Rel. opbrengst	Gemiddeld	Kiemrust	8
OWG	490	Bewaarbaarheid	7,5

Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare pl/ha
28/35	18 cm	74.000 pl/ha
35/55	29 cm	46.000 pl/ha

Bemestingrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	160-200	2/3	1/3
P ₂ O ₅	o.b.v. bodemanalyse	4/4	
K ₂ O	250-270	3/4	1/4

Aardappelmoetheid

Wratziekte

Ro1	Ro2,3	Pa2	Pa3	F2/6	F18
9	8	9	9	10	8

Aandachtspunten

Poten

- Pootgoed in het witte-puntjesstadium en in een goede structuur poten.

Teelt

- Lijkt niet gevoelig voor Sencor.
- 2e N-gift na knolzetting.
- Lijkt gevoelig voor Alternaria; preventieve bestrijding aanbevolen.
- Bruinverkleuring is een aandachtspunt, Calcium en Borium bemesting lijkt zinvol (niet als bladbemesting).

Oogst & bewaring

- Doodgespoten perceel goed laten afharderen; Simphony is gevoelig voor rooibeschatiging en stootblauw. Rooi alleen bij droog weer.
- Na oogsten het product zo snel mogelijk droog draaien en droog houden.
- Na de wondheling geleidelijk terugkoelen en bewaren bij een stabiele temperatuur van 7,5 °C.