



Eigenschappen

# Travolta



Afrijping	6,3 (middenvroeg)
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Lichtgeel
Aantal kn/pl	12
Grofheid	8
Stootblauw	5
Rooibeschatiging	6
Rel. opbrengst	Vrij hoog
OWG	420
Phytophthora-loof	5

Phytophthora-knol	8
Schurft	6
Ro 1/4, Ro2/3	R (9), LV (6)
Wratziekte f1	WV
Kringerigheid	7
Y-virus	6
Kooktype	B
Frites	8
Kiemrust	8
Bewaarbaarheid	7

## Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare pl/ha
35/45	33 cm	40.500 pl/ha
35/50	35 cm	38.000 pl/ha
45/50	37 cm	36.000 pl/ha
50/60 gesneden	35 cm	38.000 pl/ha

## Bemestingrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	200-240	3/4	1/4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	o.b.v. bodemanalyse	4/4	
K <sub>2</sub> O	300-350	3/4	1/4

## Aandachtspunten

### Poten

- Pootgoed niet koud uit de koeling poten. Eerst laten opwarmen en in het witte-puntjesstadium poten.
- Poot 3 cm onder maaiveld en zorg voor een goede rugopbouw om vergroening te voorkomen
- Voorzichtig bij Rhizoctonia-behandeling met chemische middelen wanneer de ogen geopend zijn. Kiemen en geopende ogen van Travolta zijn daar gevoelig voor.
- Door lange knolvorm kans op missers met bekerpootmachine; rijd niet te snel tijdens het poten.
- Lange knollen in de grotere pootgoed maat, goed te snijden.

### Teelt

- Reageert in opbrengst goed op koper- en kaliumrijke bemesting (bijvoorbeeld varkensmest).
- Bij droogte tijdig beregenen; bevordert knolvorm en opbrengst.
- 2e N-gift na knolzetting. Geef een K-gift ruim voor het poten én rond knolzetting.
- Gevoelig voor Alternaria; gewasbescherming starten rond bloei.

### Oogst & bewaring

- Doodgespoten perceel goed laten afharden; Travolta is iets blauwgevoelig, heeft lange knollen en een hoog OWG. Zorg voor voldoende grond tijdens rooien.
- Na de wondheling geleidelijk terugkoelen en bewaren bij een stabiele temperatuur van 8 °C.