



Eigenschappen

# Victoria



Afrijping	6 (midden)
Schilkleur	Geel
Vleeskleur	Geel
Vorm	OLO (ovaal-lang ovaal)
Aantal kn/pl	9-11
Grofheid	8
Stootblauw	5
Rooibeschatiging	7
Rel. opbrengst	Hoog
OWG	380
Phytophthora-loof	4

Phytophthora-knol	7
Schurft	5
Ro 1,4	R
Wratziekte f1,6	R
Kringerigheid	8
Y-virus	4
Kooktype	B
Frites	8
Kiemrust	7
Bewaarbaarheid	7

## Plantafstanden (afhankelijk van het aantal knollen per 10 kg)

Maat	75 cm rug	Planten per hectare pl/ha
28/35	25-27 cm	51.000 pl/ha
35/50	34-36 cm	38.000 pl/ha
50/55	38-40 cm	33.000 pl/ha
50/60 gesneden	32-34 cm	40.000 pl/ha

## Bemestingrichtlijn (advies sterk afhankelijk van bodemanalyse)

Meststof	kg/ha	Toepassing 1e	Toepassing 2e
N	200-240	2/3	1/3
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	o.b.v. bodemanalyse	4/4	
K <sub>2</sub> O	250-270	3/4	1/4

Geen chloorkali kort voor het poten

## Aandachtspunten

### Poten

- Pootgoed niet koud uit de koeling poten. Eerst laten opwarmen en in het witte-puntjesstadium poten.
- Bij voorkeur op klei- en zavelgrond met een goede structuur (gevoelig voor misvorming).
- Goede, brede rugopbouw aanhouden.
- Rhizoctonia-behandeling wordt geadviseerd.

### Teelt

- Gevoelig voor Sencor, ook vóór opkomst.
- 2e N-gift na knolzetting.

### Oogst & bewaring

- Doodgespoten perceel goed laten afharden; Victoria is matig gevoelig voor rooibeschatiging en stootblauw.
- Na de wondheling geleidelijk terugkoelen en bewaren bij een stabiele temperatuur van 7 °C.
- Kort maar regelmatig ventileren om CO<sub>2</sub>-ophoping te voorkomen.